



KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Farabi Hastanesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)
Başhekimliği

EKSTRAVAZASYON HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

Dok. Kod: KH.FR.01 | Yayın Tarihi:10.03.2021 | Revizyon No:01 | Revizyon Tarihi:06.11.2023 | Sayfa Sayısı:1

Hastanın Adı, Soyadı	
Dosya Numarası	
Tedavi Aldığı Tarih	
Tedavi Aldığı Klinik	

**Kemoterapi İlaçlarının
Damar Dışına Sızdığından Şüphelenilen Durumlarda
Yapılması Gereken Uygulamalara İlişkin Bilgiler**

Kemoterapi tedavisi alırken bazı ilaçlar..... a yerleştirilen iğnenin damar dışına çıkması sonucu çevre dokuya sızabilir. Doku hasarı riskinin ve rahatsızlık hissini azaltmak için aşağıdaki önerilere uyunuz.

- Kolunuzu 1-2 yastıkla destekleyerek kalp seviyesinin üstünde tutmaya çalışınız
- Doktor ya da hemşirenizin görüşünü almadan bu bölgeye krem, losyon ya da herhangi bir ilaç uygulamayınız.
- Bölgeye direk basınç uygulamayınız bandaj ya da sargı uygulamayınız.

Aldığınız İlaça göre aşağıda size anlatılanlardan size söyleneni uygulayınız

Soğuk Uygulama	İlk 30-60 dakika soğuk uygulamadan sonra önümüzdeki 2-3 gün (48-72 saat) içinde günde 2-3 saatte bir 15 dakika süre ile soğuk kompres uygulayınız. Bu uygulamaya / / Tarihine kadar devam ediniz.
Sıcak Uygulama	İlk 30-60 dakika sıcak uygulamadan sonra önümüzdeki 2-3 gün (48-72 saat) içinde günde 2-3 saatte bir 15 dakika süre ile sıcak kompres uygulayınız, mümkünse bu uygulamaya//..... Tarihine kadar devam ediniz.

Aşağıdaki Semptomlardan Herhangi Birisi Olduğunda Doktor Ya Da Hemşireyle İletişime Geçiniz

- İlaç verilen damar etrafında kırmızılık, şişlik, yanma ya da ağrı hissi
- Cilt üzerinde siyahlık ya da ciltte soyulma
- Omuz, el ya da bilekte hareket güçlüğü
- Etkilenen bölgede sıcaklık artışı